

MY PIA MOMENT

臨床干預措施

《近視時刻》將向您簡要介紹已經證實有效的用於管理進行性近視的臨床干預措施，以及如何根據您對兒童及其家庭的瞭解選擇干預措施。如需更多詳細資訊，請參閱資料來源。

干預措施

目前研究顯示，在一般情況下，如果按要求佩戴，近視管理干預措施平均可減少近視加深 50%。

請注意，並非所有國家/地區都批准用於近視管理的所有干預措施，如使用未經批准的干預措施即屬於藥品仿單標示外使用。

*近視管理的目標是減緩或阻止近視的進展；在研究中，干預效果通常顯示為與未接受治療的對照組相比，近視進展程度減少的百分比。干預效果通常因患者和干預措施的不同而有顯著差異。



軟性雙焦點或多焦點隱形眼鏡



近視控制專用的鏡片



角膜矯型術



阿托品眼藥水。

為您的患者選擇最好的干預措施

由於干預效果因患者而異，因此必須儘早進行干預，確保高依從性，從而獲得可能的最佳結果。選擇最適合近視兒童及其家庭生活方式和生活階段的干預措施。

考慮這些患者的個人情況，並考慮如何根據這些資料制定最合適的近視管理方案：

喜歡運動的兒童

請考慮



如果父母或兒童覺得尚未準備好或無法接受隱形眼鏡

請考慮



不喜歡戴眼鏡和/或可能缺乏自信的兒童

請考慮



喜歡整天戴眼鏡的兒童

請考慮

